

こんなときは、どうするの？

〈 病院にかかる目安 〉



	あわてずに 様子を見ましょう	診療時間内なら受診 (翌朝までは待てる)	急いで病院へ (場合により救急車)
お熱が出たら	<ul style="list-style-type: none"> *熱はあっても元気で、水分もよくとれる *熱さましを使うと熱がある程度下がって、おちついている 	<ul style="list-style-type: none"> *元気で水分もとれるが、生後6ヶ月未満で38℃以上 *せき、はく、げり、ポツポツなどをともなう 	<ul style="list-style-type: none"> *生後3ヶ月未満で38℃以上
ひきつけたら	<ul style="list-style-type: none"> *前に診断がついていて、いつもと同じ状況で、ひきつけ止めもある 	<ul style="list-style-type: none"> *10分以内におさまり、そのあとはおちついている 	<ul style="list-style-type: none"> *10分以上のひきつけ *ひきつけをくりかえす *意識がはっきりしない *呼吸が不安定でくちびるがむらさき色
はいたら	<ul style="list-style-type: none"> *はいてもケロリとして、ふだんと変わらない *回数や量は多くなく、水分はよくとれて、おしっこも出る 	<ul style="list-style-type: none"> *水分は何とかとれるが、はく回数や量が多い *その他のカゼ症状をとともなう 	<ul style="list-style-type: none"> *水分を受けつけない *ぐったりとして意識がはっきりしない *はき気がおさまらず、頭痛と高熱をとともなう
げりをしたら	<ul style="list-style-type: none"> *回数や量は多くなく、十分に水分がとれ、おしっこも出る 	<ul style="list-style-type: none"> *水分は何とかとれるが、げりの回数や量が多い *熱、はく、お腹が痛い、など、その他の症状をとともなっている 	<ul style="list-style-type: none"> *水分を受けつけない *げりの回数や量が非常に多く、ぐったりとしている
ポツポツが出たら	<ul style="list-style-type: none"> *かゆみや痛みもなく、元気にしている *ポツポツだけで、他の症状はない 	<ul style="list-style-type: none"> *かゆみや痛みはあるが、ガマンできるはんい *熱やその他のカゼ症状をとともなっている 	<ul style="list-style-type: none"> *眠れないほどかゆい *かゆみとは別に、息苦しさを感ずる
頭をうったたら	<ul style="list-style-type: none"> *すぐに泣いたが、その後はケロリとして、ふだんと変わらない様子 	<ul style="list-style-type: none"> *元気がなく、不機嫌だが、吐いたりせず、水分等も受けつける 	<ul style="list-style-type: none"> *はき気がおさまらない *ぐったりとして、反応も鈍い／おかしい *手足がけいれんしたり、マヒしたりしている